

نگاهی به باورها و رفتارهای اشتباه در بروخورد با گریههای خانگی و خیابانی در ایران

زمینه‌اندیشی فرد/ دانشجوی کارشناسی علوم تهمیه دانشگاه تهران



پیشرفت ه تمامی زنان پس از اطلاع از بارداری مورد آزمایش سرمی توکسوبلاسموز قرار می‌گیرند. افرادی که از نظر سرمی مثبت هستند (قبل ابا انگل آلوده شده‌اند) در طول بارداری با خطری مواجه نیستند، ولی افرادی که از نظر سرمی منفی هستند (تاکنون به انگل توکسوبلاسمما آلوده نشده‌اند) تحت آموزش‌های لازم برای جلوگیری از ابتلاء به توکسوبلاسمما در طول بارداری قرار می‌گیرند. احتمال آلودگی به انگل توکسوبلاسمما از طریق مواد غذایی بسیار بیشتر از تماس مستقیم با مدفع گریه است و نیز تماس با گریه و یا مدفع آن در دوران پیش از بارداری مضر نبوده و حتی در دوران بارداری هم تقریباً بی خطر است.

ه هر گونه تماس با گریه بیمار سبب انتقال بیماری به انسان می‌شود

لازم است بدانید اغلب بیماری‌هایی که گریه‌ها را درگیر می‌کند برای انسان هیچ گونه خطری ندارد، پس لازم است در ابتدا نشانه‌های ظاهری بیماری گریه را تشخیص بدھید و با مطالعه درباره بیماری‌هایی که چنین علائمی را بروز می‌دهند تصمیم گیری کنید، به عنوان مثال هر پس ویروس و کلسی ویروس از بیماری‌های رایج و شدید در گریه‌ها به ویژه بچه‌گریه‌ها است که علائمی نظیر خروج چرک و ترشحات از دهان، چشم و بینی، بسته شدن چشم‌ها، تنفس دردناک، بوی عفونت، کاهش اشتها، از دست دادن سریع وزن طی چند روز و بی‌حالی را نشان می‌دهد که با وجود چنین علائمی عامل این بیماری برای انسان خطری نداشته و می‌توان با رعایت نکات اینمی گریه بیمار را جهت درمان به دامپزشک ارجاع داد. وقت کنید که جلوگیری از انتشار بیماری مانع از ایجاد یک اپیدمی شدید شده و سلامت و بهداشت جامعه نیز حفظ می‌شود.

ه غذا ندادن به گریه‌های خیابانی (dsh) جهت کنترل جمعیت گریه‌ها

عدم رساندن غذای سالم به گریه‌ها خیابانی نه تنها روش مؤثر برای کنترل جمعیت آن‌ها نیست بلکه می‌تواند سبب به خطر افتادن بهداشت عمومی جامعه شود و همچنین از نظر اخلاقی رفتار مناسبی نیست، چراکه گریه‌های خیابانی اهلی شده به دست انسان هستند و در محیط شهری توانایی یافتن غذا را ندارند و اگر بخواهند از مosh‌های سطح شهر تغذیه کنند می‌توانند وارد یک چرخه آلوده و بیمار شوند، زیرا مosh‌ها از زباله‌های انسانی تغذیه می‌کنند و خود ناقل بسیاری از بیماری‌های گوناگون دیگر هستند که ممکن است گریه‌ها را ناقل کرده و چون تماس انسان با گریه بیشتر از مosh است، در این صورت انسان راحت‌تر در معرض بیماری‌های جدید قرار می‌گیرد. در عین حال روش ایمنی مناسبتری مثل عقیم‌سازی وجود دارد.

ه غذا رسانی به گریه‌ها در کنار سطل‌های زباله

قرار دادن غذای گریه‌ها در یک مکان مشخص مثل سطل‌های زباله که محیطی به شدت آلوده است،

با نگاهی به بروخورد و واکنش‌های متفاوت مردم در سطح شهر به گریه‌های خانگی و خیابانی، ضرورت مطالعه و افزایش آگاهی در رابطه با این حیوانات ملموس است. مردم جامعه خواه از روی علاوه و خواه از روی بیزاری نسبت به گریه‌ها، از باورها و رفتارهای غلطی تعبیت می‌کنند که ممکن است در درازمدت به ضرر جمعیت انسان و گریه‌ها تمام شود. رفتار هر فرد در بروخورد با یک حیوان از تجربیات و آموزش‌هایی که از کودکی از طرف خانواده یا جامعه کسب کرده است، نشأت می‌گیرد. به عنوان مثال ترس و بیزاری از گریه ممکن است حاصل تجربه‌ای تلخ در دوران کودکی و یا منع شدن از طرف خانواده برای نزدیک شدن به یک گریه به علت احتمال بیمار شدن باشد؛ و می‌توان علت اصلی این قبیل از مشکلات را در عدم شناخت و آگاهی دانست، بنابراین به شرح ۸ مورد از این رفتارها و باورهای غلط می‌پردازیم.

ه تماس با گریه سبب ناباروری و سقط‌جنین می‌شود

یکی از عواملی که باعث ایجاد ترس از نزدیک شدن به گریه می‌شود، باوری نادرست و اشتباه در رابطه با ناباروری بعد از تماس طولانی مدت با گریه است. باید دانست که ناباروری و سقط‌جنین توسط گریه شرایطی دارد که به درست بود وجود می‌آید. بیماری توکسوبلاسموز توسط انگل آغازی به نام توکسوبلاسمما گوندی منتقل می‌شود. میزان شکل نابالغ این انگل گوسفند، خوک، موش و انسان است و تنها میزان شکل بالغ این انگل گریه است به گونه‌ای که این انگل داخل روده گریه تکثیر شده و می‌تواند تخم تولید کند و از طریق مدفع دفع نماید. تخم دفع شده این انگل پس از ۲ تا ۵ روز قرار گرفتن در خاک و محیط مناسب می‌تواند به شکل عفونتزا تبدیل شود و در این صورت قادر است تا ماه ها در خاک زنده بماند. در صورتی که تخم‌های انگل فعال شده موجود در مدفع گریه توسط انسان خورده شود، انگل داخل بافت‌ها تکثیر شده و ممکن است سبب ایجاد کیست‌های بسیار کوچک میکروسکوپی در بافت‌های مختلف شود. این کیست‌ها در انسان توسط سیستم اینمی افراد سالم به شدت مهار شده و عموماً تا پایان عمر هرگز مجددأ فعال نمی‌شوند. تنها در افرادی که به دلیل بیماری‌هایی مانند ایدز و یا شیمی‌درمانی شدید چهار ضعف سیستم اینمی شده باشند ممکن است کیست‌های قدیمی مجددأ فعال شوند که در این صورت نیز می‌توان با درمان آنتی‌بیوتیکی آن را از بین بردا. از نظر علمی نیز مشخص شده که احتمال آلودگی انسان از طریق تماس با موی گریه غیرممکن است. در کشورهای



گربه مادر در دسترس شما نیست، بهترین راه حل افزودن ماست پروپوپتیک یا کمی آنتیم لاكتاز برای خنثی‌سازی اثر لاكتوز شیر است. همچنین دقت کنید برای تغذیه بچه‌گربه‌های تازه متولدشده که مادر خود را از دستدادند و آغوز مصرف نکرده اند، به علت عدم دریافت آنتی‌بادی‌های مورد نیاز سیستم ایمنی آن‌ها بهشدت ضعیف است، پس ابتدا دست‌های خود را ضدغونه کنید و به شیر موردنظر یک قاشق سوبخوری روغن ذرت، سه زرده تخمر غ سالم و سه قطره مولتی ویتامین اضافه کنید.

۵ درمان خودسرانه گربه بیمار بدون نظارت دامپزشک

زمانی که در گربه‌ها علائم بیماری مثل عفونت و ترشحات چشمی و دهانی را مشاهده می‌کنید، از استفاده خودسرانه از داروهای انسانی برای درمان و کنترل بیماری در گربه بیمار بپرهیزید، چرا که اغلب داروهای انسانی مثل مسکن‌ها یا قرص‌های سرماخوردگی که دارای استامینوفن یا ایبوپروفن هستند، در گربه‌ها ایجاد مسمومیت کرده و کشنده است. استامینوفن به عنوان یک داروی تب بر و ضد درد، برای استفاده در بیماری‌های انسانی به اشکال مختلف موجود است. هنگامی که برای کنترل تب یا درد در گربه، این فراورده مورد استفاده قرار می‌گیرد، گربه تا حدود زیادی به اثرات سمی استامینوفن حساسیت نشان می‌دهد و در بسیاری از موارد سبب مشکلات تنفسی، استفراغ، ادم صورت و پنجه‌ها و در موارد شدید منجر به مرگ می‌شود. همین‌طور استفاده از قطره‌های چشمی بدون تشخیص دامپزشک، برای کنترل عفونت‌های چشمی در گربه‌ها، می‌تواند سبب کور شدن آن‌ها شود، چراکه بسیاری از عفونت‌های چشمی علل داخلی داشته و با نابودی عامل پاتوژن در داخل بدن عفونت به‌خودی خود خوب می‌شود. نکته مهم دیگر این است که به هیچ عنوان به طور خودسرانه از آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان گربه بیمار استفاده نکنید، چراکه اگر نوع آنتی‌بیوتیک یا طول دوره لازم برای درمان اشتباه تشخیص داده شود یا اصلاً احتیاجی به استفاده از آنتی‌بیوتیک نباشد اما بی‌دلیل به کار برده شود، می‌تواند سبب بروز مقاومت میکروبی شده و در درازمدت یک آنتی‌بیوتیک مشخص را بر عوامل پاتوژن بی‌اثر کند؛ و مقاومت میکروبی مسئله و چالشی مهم و خطرناک برای بهداشت عمومی جامعه است.

سخن پایانی

آگاهی مقدمه کنار گذاشتن ترس‌ها و باورهایی است که از کودکی به همراه ماست و حتی اگر یک نفر آگاه شود، می‌تواند جامعه نسل فردای خود را آگاه کند؛ بنابراین افزایش شناخت نسبت به تأمین سلامت یک حیوان و ارتباط مؤثر و یاری‌دهنده با آن‌ها، سلامت جامعه انسانی را بهبود می‌بخشد و ما را یاری می‌دهد تا فرزندانی آگاه‌تر تربیت کنیم.

منابع

- ۱- عزیزیان، مصطفی. (۱۳۹۵). مقاومت میکروبی در دام و چالش‌های بهداشتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، ۳۱ و ۳۲.
- ۲- مصلی نژاد، بهمن و همکاران. (۱۳۸۶). گزارش درمانگاهی سه مورد مسمومیت ناشی از استامینوفن (Acetaminophen) در گربه‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز، در: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

سبب می‌شود تا همیشه سطلهای زباله تبدیل به مکانی برای عبور و مرور گربه‌ها از محله‌های مختلف شود. همین امر باعث بدل شدن سطلهای زباله به محیطی مناسب برای اجتماع هزاران عامل بیماری‌زای مختلف می‌شود و گربه‌ها با رفتان به مکان‌های مختلف عوامل جدید بیماری‌زا را با خود حمل کرده و به حیوانات دیگر منتقل می‌کنند. بهترین راه حل برای غذا رسانی به گربه‌ها این است که غذارا در ظرفی تمیز و در محیطی دور از سطلهای زباله قرار دهیم که این کار در درازمدت سبب دور شدن گربه‌ها از سطلهای زباله می‌شود.

۶ تغذیه گربه‌ها با گوشت ماهی، استخوان مرغ، استخوان ماهی، چربی مرغ

درست است که گوشت ماهی منبع مناسبی برای تأمین پروتئین مورد نیاز گربه است اما این را در نظر داشته باشید که گوشت ماهی حاوی آنتیمی‌هایی است که سبب تخریب ویتامین B در دستگاه گوارش گربه شده و منجر به بروز مشکلات سیستم عصبی، تشنج و کاما می‌شود. مصرف مکرر بافت چربی مرغ نیز سبب آسیب دیدن دستگاه گوارش می‌شود. استخوان مرغ و ماهی نیز می‌تواند سبب انسداد مجاری تنفسی و مجاری گوارشی شود. مناسب‌ترین غذا برای گربه گوشت یا مرغ پخته شده بدون استخوان و همینطور تخم مرغ

پخته
شده است،
همچنین بدن
گربه نیاز به فیبر
دارد که می‌تواند آن را
از هویج یا کدویی
پخته دریافت کند.

* گربه‌های ماست نمی‌خورند

ماست کم‌چرب از جمله غذاهایی هست که برای تغذیه گربه‌ها مناسب بوده و پیشنهاد می‌شود، گربه‌ها نه تنها طعم ماست را دوست دارند، بلکه مصرف آن برای سلامت گربه بسیار مفید است، چراکه سبب بهبود عملکرده سیستم ایمنی، هضم آسان غذاهای دیگر، کمک به درمان اسهال بچه‌گربه‌ها و افزایش توانایی هضم باکتری مفیدی به اسم پروپوایوتیکز می‌شود. البته به این نکته دقت کند که ماست نباید طعم دار باشد.

* تغذیه بچه گربه‌ها با شیر گاو

یکی از رفتارهایی که افراد برای کمکرسانی به بچه گربه‌های با مادر یا یتیم انجام می‌دهند تغذیه آن‌ها با شیر گاو است، اما شیر گاو حاوی لاكتوز بوده و دستگاه گوارش بچه گربه آنتیم تجزیه‌کننده لاكتوز را ندارد، در نتیجه بچه گربه اسهال می‌شود؛ اما اگر قصد تغذیه بچه گربه با شیر گاو را دارید و مواد جایگزین شیر

